

Conocer sobre los accidentes cerebrovasculares

Evaluación y tratamiento

Interrumpir el accidente cerebrovascular con tratamiento inmediato

Aunque el accidente cerebrovascular es un ataque al cerebro, puede afectar a todo el cuerpo, causando desde problemas graves del habla hasta parálisis. Los efectos del accidente cerebrovascular varían de leves a graves.

Los tipos y grados de discapacidad dependen de qué área del cerebro esté dañada, e incluyen:

- Parálisis o problemas de control de movimientos
- Cambios en la visión, audición y otros sentidos
- Dificultad para hablar o comprender el lenguaje
- Dificultad para recordar y pensar

El tratamiento del accidente cerebrovascular no puede esperar



Mueren 2 millones de células cerebrales cada minuto que pasa durante un accidente cerebrovascular, lo que aumenta el riesgo de daño cerebral permanente, discapacidad o muerte.

Llegar a un hospital rápidamente salva vidas y aumenta las probabilidades de una recuperación exitosa.

Llegar a un hospital **rápidamente** salva vidas y aumenta las probabilidades de una recuperación exitosa.



National Institute of
Neurological Disorders
and Stroke

Escala de accidentes cerebrovasculares del NIH

La Escala de accidentes cerebrovasculares del National Institutes of Health (NIH) ayuda a los médicos a evaluar la gravedad de un accidente cerebrovascular. Los proveedores de atención médica utilizan la escala de accidentes cerebrovasculares para medir la función neurológica y los déficits, pidiendo a la persona que responda preguntas y realice varias pruebas físicas y mentales.

¿Cómo se trata un accidente cerebrovascular?

El accidente cerebrovascular isquémico, el tipo más común, puede tratarse con el medicamento t-PA, que disuelve los coágulos de sangre que obstruyen el flujo sanguíneo al cerebro. La ventana de tiempo para iniciar el tratamiento es de cuatro horas y media, pero los pacientes deben llegar al hospital rápidamente para ser evaluados y recibir tratamiento.



Un estudio de cinco años realizado por NINDS encontró que algunos pacientes con accidente cerebrovascular que recibieron t-PA dentro de las tres horas posteriores al inicio de los síntomas tenían al menos un 30 % más de probabilidades de recuperarse con poca o ninguna discapacidad después de tres meses.



MÁS
INFORMACIÓN

